

Дабигатрана этексилат Канон
Капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг
(МНН: Дабигатрана этексилат)

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

2024 г.



ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия, 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105



Тел.: +7 (495) 797-99-54, факс: +7 (495) 797-96-63, www.canonpharma.ru

**КАРТОЧКА-ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ ПРЕПАРАТ
ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ КАНОН**

Данная памятка содержит важную информацию о безопасности, о которой Вам необходимо знать, прежде чем начнете принимать лекарственный препарат (ЛП) Дабигатрана этексилат Канон, капсулы 75 мг, 110 мг, 150 мг, и во время лечения.

Храните эту памятку при себе и показывайте ее любому специалисту системы здравоохранения, участвующему в вашем лечении.

- ЛП Дабигатрана этексилат Канон предотвращает образование опасных тромбов.
- Следует принимать данный препарат только в соответствии с указаниями лечащего врача. Не следует прекращать прием препарата, не проконсультировавшись с лечащим врачом.
- Следует проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом всех лекарственных препаратов, включая биологически активных добавок, витаминов и ЛП, которые отпускаются по рецепту и без рецепта.
- Если Вам предстоит хирургическая операция или инвазивные вмешательства, необходимо до проведения процедуры сообщить врачу (в том числе и стоматологу) о том, что Вы принимаете ЛП Дабигатрана этексилат Канон.
- Следует проглотить капсулу полностью, запив ее полным стаканом воды. Не следует разламывать, разжевывать или открывать капсулу.
- Если Вы забыли принять препарат, просто примите следующую запланированную дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием препарата.
- Если Вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, диклофенак, кеторолак), проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как они могут значительно повысить у Вас риск кровотечения.
- Обратите внимание на следующие факторы риска, повышающие риск кровотечения: возраст старше 75 лет, значительные кровотечения в прошлом, нарушение функции почек, печени, желудка (эзофагит или гастрит), прием препаратов, влияющих на свертываемость крови (аспирин или другие препараты, снижающие свертываемость крови).
- Для получения полной информации о препарате следует ознакомиться с листком-вкладышем.

Следует немедленно обратиться к врачу в следующих случаях:

- Следует немедленно обратиться к врачу, если у Вас появился какой-либо из следующих признаков или симптомов, свидетельствующих о кровотечении: отек, неприятные ощущения, необъяснимые боли или головные боли, головокружение, бледность, слабость, необычные гематомы, носовые кровотечения, кровотечения из десен, длительные и необычные кровотечения из порезов на коже, необычные менструальные кровотечения или вагинальные кровотечения, кровь в моче (может быть красного или коричневого цвета), красный или черный стул, кашель с кровью, кровавая рвота или рвота в виде кофейной гущи.
- Если Вы упали или поранились в период, когда получаете препарат (в особенности, если Вы ударились головой), следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Лечащему врачу следует заполнить следующие данные:

Имя и фамилия пациента:

Дата рождения:

Группа крови:

Цели лечения (обозначьте в соответствующем квадрате):

Профилактика инсульта

Профилактика венозной тромбоэмболии после ортопедической операции

Лечение тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии и профилактика их рецидива

Дозировка и время приема:

Функция почек в начале приема препарата:

(клиренс креатинина мл\мин)

Дата начала лечения:

Имя и фамилия лечащего врача:

Телефон лечащего врача:

При обращении за медицинской помощью, включая экстренные случаи, следует сообщить медицинскому персоналу о том, что пациент получает Дабигатрана этексилат Канон.

Заполните данные контактного лица, для того, чтобы связаться в экстренных ситуациях:

Имя, фамилия:

Номер мобильного телефона: